


Anemia and hemodilution: analysis of a single center cohort based on 2,858 red cell mass measurements

Louis Drevon,^{1,2,3} Nabih Maslah,^{1,2,3} Juliette Soret-Dulphy,^{2,4} Christine Dosquet,^{1,2,3} Odno Ravdan,¹ Laetitia Vercellino,⁵ Célia Belkhdja,^{1,2,3} Nathalie Parquet,⁶ Anne C. Brignier,⁶ Marie-Hélène Schlageter,^{1,2,3} Bruno Cassinat,^{1,2,3} Jean-Jacques Kiladjian,^{2,3,4} Christine Chomienne^{1,2,3} and Stéphane Giraudier^{1,2,3}

¹APHP, Service de Biologie Cellulaire, Hôpital Saint-Louis, F-75010 Paris; ²France Intergroupe des Syndromes Myéloprolifératifs (FIM); ³Université de Paris, U1131 INSERM, IRSL, F-75010 Paris; ⁴APHP, Centre d'Investigations Cliniques, Hôpital Saint-Louis, F-75010 Paris; ⁵APHP, Service de Médecine Nucléaire, Hôpital Saint-Louis, F-75010 Paris and ⁶APHP, Service d'Aphérèse Thérapeutique, Hôpital Saint-Louis, F-75010 Paris, France

Correspondence: STEPHANE GIRAUDIER - stephane.giraudier@aphp.fr

doi:10.3324/haematol.2020.249409



Supplementary figure 1. Diagnostic Chart.

The number of patients concerned in each step of the chart is noted next to each item (n).